Bioestimulante Prebiótico

Uso: Fertilizante
Ingrediente(s) Activo(s): B, Fe, Mn, Co, Mo, Zn
Concentración: 0.03% + 0.10% + 0.10% + 0.002% + 0.002% + 0.05%
Formulación: Líquido
Registro COFEPRIS: RSCO-0020/IV/2012

¿Qué puede hacer por mí FOLIAR BLEND?

FOLIAR BLEND® representa una nueva generación tecnológica de Bioestimulantes, que contiene carbohidratos complejos, macro y micronutrientes esenciales para las plantas: una innovadora mezcla patentada de enzimas benéficas, aminoácidos y muchos estimulantes naturales de las plantas y del suelo, ausentes en los productos agroquímicos ordinarios. FOLIAR BLEND® tiene un intenso efecto en la planta y en el suelo.

¿Porque debo usar FOLIAR BLEND?

FOLIAR BLEND® Bioestimualante Agrícola es un producto activador de suelos y planta. Permite ser incorporado en un programa de fertilización o fitosanitario convencional para facilitar la absorción de nutrientes y fortalecer los procesos de síntesis proteica, así como el crecimiento de las plantas y la formación de raíces.

Las temperaturas extremas, las condiciones climáticas adversas, las plagas, la nutrición inadecuada o desequilibrada de las plantas, pueden impedir que nuestros cultivos produzcan o den las ganancias que nos merecemos. Cuando FOLIAR BLEND® se aplica como parte de un buen programa, ayuda a mantener a las plantas y a la tierra bien cargadas con los nutrientes y los suplementos para: el crecimiento necesario, para maximizar la producción y para minimizar el estrés de las plantas.

Tabla de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Calabacita	*Bioestimulante*	1.5 L/a	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Calabaza	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Melón	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Pepino	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Sandía	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Chayote	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Tomate	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 -5 L/ha / Ciclo del cultivo
Chile	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación en el transplante en drench o en el sistema de riego, la segunda en la primera floración y la tercera en primer amarre de fruto. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Cebolla	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	El primer tratamiento al momento de la siembra, la segunda aplicación cuando se tengan 10 cm de crecimiento y la tercera 20 días después. 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Zanahoria	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	El primer tratamiento al momento de la siembra, la segunda aplicación cuando se tengan 10 cm de crecimiento y la tercera 20 días después. 3 L/ha / Ciclo del cultivo

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Papa	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Realizar la primera aplicación a los 15 días posteriores a la siembra, la segunda a los 30-45 días con la labor de aporque y la tercera aplicación vía foliar a los 60 días 4 - 5 L/ha / Ciclo del cultivo
Arroz	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación 2 L en mezcla con los herbicidas post emergentes; la segunda aplicación 1 L a inicio del macollamiento en mezcla con fertilizantes y/o insecticidas. 3 - 4 L/ha / Ciclo del cultivo
Maíz	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación a los 5 -10 días de sembrado el maíz en mezcla con cualquier producto, la segunda aplicación a los 30 días en mezcla con el herbicida post emergente, la tercera a inicio de floración. 3 - 4 L/ha / Ciclo del cultivo
Frijól	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación a los 5 -10 días de sembrado el frijol en mezcla con cualquier producto, la segunda cuando aparezca la 3-5 hoja trifoliada, y la tercera a inicio de floración. 3 - 4 L/ha /Ciclo del cultivo

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Cítricos	*Bioestimulante*	2 L/ha	Sin Límite	4 horas	Se recomienda la primera aplicación previo a la floración, la segunda en plena floración, la tercera en amarre de fruto y la cuarta 15 días despues de la tercera. 8 L/ha / Ciclo del cultivo
Mango	*Bioestimulante*	2 L/ha	Sin Límite	4 horas	Se recomienda la primera aplicación previo a la floración, la segunda en plena floración, la tercera en amarre de fruto y la cuarta 15 días despues de la tercera. 8 L/ha / Ciclo del cultivo
Banano	*Bioestimulante*	2 L/ha	Sin Límite	4 horas	Se recomienda la primera aplicación previo a la floración, la segunda en plena floración, la tercera en amarre de fruto y la cuarta 15 días despues de la tercera. 6 - 8 L/ha / Ciclo del cultivo
Piña	*Bioestimulante*	2 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicar cada dos ciclos de fertilización 10 L/ha / Ciclo del cultivo
Café	*Bioestimulante*	2 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicar junto con la fertilización 6 L/ha / Ciclo del cultivo
Brócoli	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación en la siembra o transplante, la segunda cuando se tienen de 4 a 6 hojas verdaderas y 15 días después la tercera. 3 L/ha / Ciclo del cultivo
Lechuga	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación en la siembra o transplante, la segunda cuando se tienen de 4 a 6 hojas verdaderas y 15 días después la tercera. 3 L/ha / Ciclo del cultivo

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Col	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación en la siembra o transplante, la segunda cuando se tienen de 4 a 6 hojas verdaderas y 15 días después la tercera. 3 L/ha/ Ciclo del cultivo
Coliflor	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación en la siembra o transplante, la segunda cuando se tienen de 4 a 6 hojas verdaderas y 15 días después la tercera. 3 L/ha / Ciclo del cultivo
Apio	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación en la siembra o transplante, la segunda cuando se tienen de 4 a 6 hojas verdaderas y 15 días después la tercera. 3 L/ha /Ciclo del cultivo
Caña de Azúcar	*Bioestimulante*	1.5 L/ha	Sin Límite	4 horas	Se recomienda la primera aplicación al momento de la siembra y una segunda aplicación a los treinta días. 3 L/ha / Ciclo del cultivo
Rosas	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación previa a la emisión de botones; la segunda en pleno botoneo y la tercera 20 días después. 3 L/ha /Ciclo del cultivo
Ornamentales	*Bioestimulante*	1 L/ha	Sin Límite	4 horas	La primera aplicación previa a la emisión de botones; la segunda en pleno botoneo y la tercera 20 días después. 3 L/ha / Ciclo del cultivo

Recomendaciones de uso

Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados

¡Siempre calibre su equipo de aplicación!

Métodos para preparar y aplicar el producto

Solo vierta el contenido de este envase en las dosis indicadas en la tabla de recomendaciones.

Contraindicaciones

Mantenga siempre FOLIAR BLEND fuera de la luz solar. En aplicación foliar de FOLIAR BLEND® evite las horas de más temperatura y no aplicar ni antes o inmediatamente después de llover.

Fitotoxicidad

FOLIAR BLEND no es fitotóxico.

Incompatibilidad

Puede ser aplicado en mezcla con algunos productos químicos y biológicos como: fertilizantes foliares o solubles en fertirriego, quelatos (orgánicos o inorgánicos), complejos enzimáticos, ácidos húmicos, bioestimulantes y herbicidas.

Garantía

El formulador garantiza la composición correcta y el contenido neto del producto en el envase perfectamente sellado. El usuario será el responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) debido a un mal manejo o inadecuado almacenamiento. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Titular del registro

DISTRIBUIDOR: SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V. Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec C.P. 11580 México, D.F. Tel. (55) 5279-4340 www.summitagromexico.com.mx TITULAR DEL REGISTRO AGRI GRO MEXICO, SA DE CV. Alta tensión No. 98 local 15 Molino de rosas. C.P. 01470 Ciudad de México.