AGRICAM®

FICHA TÉCNICA

DARK®

Piriproxifen
Insecticida /Concentrado emulsionable

RSCO-INAC-1104P-X0377-009-10.86 **LUC**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Piriproxifen: 4-fenoxifenil (RS) -2-(2-piridiloxi)propil éter (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	**10.86%**
INGREDIENTES INERTES:	
Emulsificante y disolvente	**89.14%**
TOTAL	**100.0%**

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

"ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO PARA SU APLICACIÓN"

INFORMACIÓN GENERAL:

DARK es un insecticida formulado como concentrado emulsionable que inhibe el proceso de maduración de los insectos y está recomendado para su uso en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (7)	Mosquita blanca *(Bemisia tabaci)*	0.3 - 0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares con intervalo de 7 días cuando se detecta la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 352-452 L de agua/ha

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
TIEMPO DE REENTRADA DESPUÉS DE TRATAR EL ÁREA: 12 hrs.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Para realizar esta operación use el equipo de protección personal adecuado (overol impermeable con capucha, mascarilla con respirador, lentes de seguridad o careta protectora, guantes y botas de neopreno). Antes de usar el producto agite el envase. Abra el envase con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta ¾ partes de la cantidad total de agua a utilizar. Con ayuda de una probeta mida la cantidad de **DARK**, a utilizar y vierta en un recipiente limpio por separado para realizar una premezcla, agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la premezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor, agregue la cantidad de agua faltante, cierre el tanque completamente y agite hasta mezclar perfectamente.
Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque antes de volver a usarlo, si se interrumpe momentáneamente el tratamiento. La mezcla debe de ser aplicada el mismo día.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea fuerte (mayor a 10 km/h). No almacenar cerca del calor.

FITOTOXICIDAD: **DARK** no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas en esta etiqueta para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **DARK**, con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

"MANEJO DE RESISTENCIA" "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

PRESENTACIONES DISPONIBLES: 1 L, 250 ML.

Cto. San Eduardo #112,
San Juan de Ocotán C.P. 45019,
Zapopan, Jalisco
Tel. 800 002 04 02

COSECHA SEGURA®