FICHA TÉCNICA

“USO AGRÍCOLA”

FIXOPIR 100

piriproxifen

INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:		
Piriproxifen: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi)propil éter (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C).		**10.86**
INGREDIENTES INERTES:		
Emulsificante y Disolvente.		**89.14**
	Total	**100.00**

No. de registro: RSCO-INAC-1104P-X0377-009-10.86

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

“HECHO EN MÉXICO”

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

FIXOPIR 100 es un insecticida formulado como concentrado emulsionable que inhibe el proceso de maduración de los insectos y está recomendado para su uso en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (7)	Mosquita blanca *(Bemisia tabaci)*	0.3-0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares con intervalo de 7 días cuando se detecta la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 352-452 L de agua/ha
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Pimiento morrón, Tomate de cáscara (1)		50-150 mL/100 L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al momento en que se detecten los primeros individuos, adicionar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación sugerido 450-550 L de agua/ha.
Papa (7)			
Aguacate (14)	Escama armada *(Hemiberlesia lataniae)*	1.0-1.5/ 2000 L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 21 días en cuanto se detecte la presencia de la plaga en campo. Volumen de aplicación sugerido 1950-2050 L de agua/ha.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:** 12 horas después de la última aplicación			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para realizar esta operación use el equipo de protección personal adecuado (overol impermeable con capucha, mascarilla con respirador, lentes de seguridad o careta protectora, guantes y botas de neopreno). Antes de usar el producto agite el envase. Abra el envase con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta ¾ partes de la cantidad total de agua a utilizar. Con ayuda de una probeta mida la cantidad de **FIXOPIR 100**, a utilizar y vierta en un recipiente limpio por separado para realizar una premezcla, agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la premezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor, agregue la cantidad de agua faltante, cierre el tanque completamente y agite hasta mezclar perfectamente.
Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque antes de volver a usarlo, si se interrumpe momentáneamente el tratamiento. La mezcla debe de ser aplicada el mismo día.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea fuerte (mayor a 10 km/h). No almacenar cerca del calor.

FITOTOXICIDAD

FIXOPIR 100, no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas en esta etiqueta para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **FIXOPIR 100**, con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com