



Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Folicur® 250 EW

Fungicida / Dispersión (emulsión aceite en agua)

GRUPO

3

FUNGICIDA

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Tebuconazole

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Tebuconazole: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol.....	25.00
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes: solvente, emulsificante y compuestos relacionados.....	75.00
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:

4 Precaución

No. de Registro:

RSCO-FUNG-0349-302-015-025

USOS

Cultivo	Enfermedades	Dosis L/ha	Observaciones
Cebada (35)	Roya amarilla <i>Puccinia striiformis</i>	0.3 a 0.5	Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección.
	Mancha reticulada <i>Pyrenophora teres</i>	0.5 a 0.7	
	Escaldadura de las hojas <i>Rhynchosporium secalis</i>	0.5 a 0.7	
Trigo (35)	Roya de la hoja <i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>Tritici</i>	0.4 a 0.6	Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección.
	Carbón parcial <i>Tilletia indica</i>		Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Aplicar al observar los primeros síntomas durante el espigamiento-floración y en caso de ser necesario aplicar nuevamente 10 días después.
Plátano (0)	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i> , var. <i>difformis</i> Sigatoka amarilla <i>Mycosphaerella musicola</i> Cladosporium <i>Cladosporium musae</i>	0.4 + 5 a 6 L de aceite agrícola + adherente	Realizar un máximo de 8 aplicaciones en un periodo de 12 meses, en bloques de 2 aplicaciones entre 14 y 21 días, alternando con 1 o 2 aplicaciones de productos de diferente modo de acción

Folicur® 250 EW

Página 1 de 3

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar con su exportador o importador antes de aplicarlo.

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Cempasúchil (0)	Mancha foliar <i>Alternaria</i> sp	0.5 a 1.0	Realizar la primera aplicación al inicio de la formación de botones. La dosis dependerá de las condiciones ambientales que favorezcan la infección. Es recomendable hacer las aplicaciones en forma preventiva.
Sorgo para semilla* (0)	Ergot <i>Sphacelia sorghi</i>	0.4 a 0.6	Iniciar aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días, realizar un máximo de 4 aplicaciones. *El uso de Folicur 250 EW en sorgo es única y exclusivamente para lotes destinados a la producción de semilla híbrida, no se deberá aplicar en parcelas para producción de grano para consumo.
Vid (14)	Cenicilla de la vid <i>Uncinula necator</i>	0.5 a 0.75	Realizar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección.
Chile Jitomate Tomate de cáscara Berenjena Papa (7)	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	0.5 a 1.0	Realizar cuatro aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
Chile Jitomate (7)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	0.5 a 0.75	Iniciar aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso necesario a intervalos de 7-10 días, realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Soya Haba Judía Garbanzo Lenteja Frijol Chícharo (30)	Roya asiática de la hoja <i>Phakopsora pachyrhizi</i>	0.35 a 0.40	Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y el cultivo se encuentre en la etapa de llenado de grano (R4). Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días. Volumen de agua 200 L/Ha
Soya (21)	Roya asiática de la hoja <i>Phakopsora pachyrhizi</i> Mancha púrpura <i>Cercospora kikuchi</i>	0.3 a 0.4	Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y el cultivo se encuentre en la etapa de llenado de grano (R4). Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días. Volumen de agua 200 L/Ha.
Ajo (37)	Pudrición blanca <i>Sclerotium cepivorum</i>	Tratamiento a la semilla: 1.0 L/ton	Hacer el tratamiento en inmersión previo a la siembra, disolver el producto en 100 litros de agua.
		Aplicación al cuello: 1.0 a 2.0 L/ha	Aplicar al cuello de la planta a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. En infección moderada utilice la dosis baja y en infección fuerte la dosis alta. Utilice suficiente agua para lograr una buena penetración del producto.
Calabaza Calabacita Melón Pepino Sandía (7)	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4 a 0.6	Iniciar aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días, realizar un máximo de 3 aplicaciones.



Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Cebolla Cebollín (7)	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	0.5 a 0.75	Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación cada siete días con un máximo de dos aplicaciones foliares por temporada.
----------------------------	---	------------	---

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de 12 horas.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

*El uso de **Folicur® 250 EW** en sorgo es única y exclusivamente para lotes destinados a la producción de semilla híbrida, no se deberá aplicar en parcelas para producción de grano para consumo.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 y 10 L